



## ÖSZTROGÉNTÜKÖR

A különböző ösztrogén hormonok és normál szintjeik a vérben. Az ösztrogéntükör változik az életfázis, valamint a menstruációs ciklus szerint is.

17-beta-ösztradiol	Értékek a vérmintában
Termékeny korban:	
Tüszőrepedés előtt:	30 - 300 ng/l
Tüszőrepedés körül:	100 - 600 ng/l
Tüszőrepedés után:	100 - 300 ng/l
A változókorban:	< 10 ng/l
<b>Ösztron</b>	
Termékeny korban:	
Tüszőrepedés előtt:	37 - 140 ng/l
Tüszőrepedés körül:	60 - 230 ng/l
Tüszőrepedés után:	50 - 120 ng/l
A változókorban:	15 - 100 ng/l
<b>Ösztriol</b>	
Tüszőrepedés körül:	300 - 6.000 ng/l
Terhességben:	600 - 40.000 ng/l

## PROGESZTERON-TÜKÖR

A progeszteron-tükör életfázisonként nagymértékben változik, de változik a cikluson belül is. A középső oszlopban a hormon napi termelésének mértéke, a jobb oldaliban a vérben mért normálértékek láthatók.

	Napi termelés	Értékek a vérmintában
Termékeny életkorban:		
Tüszőrepedés előtt	5 – 10 mg	0.2 - 2 ng/ml
Tüszőrepedés körül	10 – 20 mg	0.8 - 3 ng/ml
Tüszőrepedés után	20 – 50 mg	3.3 - 27 ng/ml
Terhesség idején	400 mg-ig	4 - 200 ng/ml
Változókor után	10 mg	0.1 – 0.8 ng/ml
Férfiak esetében	5 – 15 mg	0.2 – 1.2 ng/ml